



rijksuniversiteit
groningen



ORANJEWOUD VRIJDAGOGHTEND

Trauma & Psychose

Marieke Pijnenborg



Trauma & Psychose

[https://www.youtube.com/watch?
v=iqdRYQUmkgQ](https://www.youtube.com/watch?v=iqdRYQUmkgQ)



PAD

Review: symptoomoverlap tussen psychotische en dissociatieve stoornissen

Onderzoeksvraag


› Hoe verklaren we de overlap in symptomen?



→ Trauma als gedeelde oorzaak?


→ Misdiagnose?

→ Classificatie lastig vol te houden?



PAD onderzoek (trauma bij dissociatie en psychose)

- 3 instellingen (GGZ Drenthe, UCP, Friesland: Phamous)
- 8 locaties
- 300 deelnemers
- 2 vragenlijsten & 1 interview



Dissociative
Experiences
Scale
(DES)

Trauma
History
Questionnaire
(THQ)

+

PANSS



Resultaten PAD: Trauma

Trauma	Percentage
seksueel	28%
misdaad	62%
lichamelijk	29%
oorlogsgeweld	1%
rampen en ongelukken	40%
overig letsel	11%
vrees voor letsel	28%
naasten	54%



Resultaten PAD: correlaties

- Dissociatieve symptomen
 - Seksueel trauma
 - lichamelijk trauma
 - rampen en ongelukken
- Positieve symptomen
 - Misdaad gerelateerd trauma
- Negatieve symptomen
 -
- Algemene symptomen
 - Seksueel trauma
 - rampen en ongelukken



Trauma en zelf-stigma

n=102 psychose spectrum stoornissen (SEM-modeling:
theoretisch model van relaties tussen data testen)



Victimisatie in de laatste vijf jaar en negatieve
symptomen hebben een directe relatie met zelf-stigma.

Verband tussen positieve symptomen en zelf-stigma
wordt gemedieerd door traumatische ervaringen.



Programma

- David van der Berg: Interactie Trauma & Psychose
- Elevator Pitches
- Berber van der Vleugel: Het dagelijks leven van mensen die dagelijks stemmen horen, voor en na behandeling. Praktische tips bij vragen naar en reageren op trauma

